



אירועים חריגים בהגנת הצומח בעונת פלפל 2009-2010

הרצאה בסיכום עונת פלפל בערבה 27 במאי 2010

סבטלנה דוברינין

מדריכת הגנת הצומח

שה"מ משרד החקלאות



ממשק ההדברה

- ביולוגי משולב, אורגני
- כימי קונבנציונלי
- כ- 6,000 דונם
- שאר השטח כ-11,000 דונם





תריפס הפרחים המערבי

חדירת המזיק למבנים באוכלוסיות גבוהות

נזקי תריפס

ממשק הדברה

כימי קונבנציונלי

עד 40% פרי נגוע


ממשק הדברה

ביולוגי משולב, אורגני

ללא נזק



ריסוסי טרייסר אולטרה בממשק הדברה ביולוגי-משולב וביולוגי-אורגני



**לעומת לפחות 5 טיפולי טרייסר ותכשירים אחרים בממשק
הדברה כימי קונבנציונלי**

בר צ., עונת 2009-2010



ריסוסים להדברת תריפס הפרחים המערבי בממשק הדברה כימי קונבנציונלי



- פרוקליים
- תכשירי אבמקטין
- טרייסר אולטרה וספרטה
- טלסטאר
- רופאסט

כמה ריסוסים?

מהי יעילות ההדברה?

כמה כסף!!!!





כנימת עש הטבק

- המזיק הופיע כבר בתחילת העונה.
- רוב האוכלוסייה- גזע Q של כנימת עש הטבק:
- א. פיתוח תנגודת לתכשירי הדברה כימיים.
- ב. ריבוי מהיר, במיוחד בטמפרטורות של השנה.
- **נזק:**
 - א. החלשת הצימוח.
 - ב. הפרשת טל דבש.



התמודדות עם כנימת עש הטבק

ממשק הדברה

כימי קונבנציונלי

תכשירים כימיים



אי יכולת להתגבר על
המזיק

ממשק הדברה

ביולוגי משולב ואורגני

אקרית הטורפת סבירסקי

אוריוס

תכשירים רכים



המזיק מתחת לסף נזק
כלכלי



רכנף חיוור

חודר למבנים בחודש אוקטובר

ממשק הדברה
כימי קונבנציונלי

העדר מודעות של המגדלים



נזקים קשים לפירות

ממשק הדברה
ביולוגי משולב ואורגני


פיקוח מזיקים מוגבר
הפעלת הטיפול בזמן הנכון



נזקים קלים אם בכלל



נזקים של רכנף חיוור





רכנף חיוור



בוגר

דרגה צעירה





זבוב הפירות הים תיכוני




- מזיק הסגר.
- סגירת היצוא לארצות הברית





נזק מזבוב הפרות הים תיכוני





תודה