





סקירת הגנת הצומח בפלפל עונת 2011-2012



סבטלנה דוברינין
מדריכת הגנת הצומח
רפרנט הגנת הצומח בפלפל
שרות הדרכה ומקצוע
משרד החקלאות

התפתחות ממשק הדברה ביולוגית משולבת בארץ



90% משטחי הפלפול המגודל בערבה





הצלחת ממשק הדברה ביולוגית משולבת

קשר בין מגדל, פקח מזיקים ויצרן אויבים טבעיים





בדיקת עמידות של תריפס קליפורני עונת 2011-2012

6.11.12 ✓ רגישה לדיויפאן ומרשל (פארן)

10.11.11 ✓ אוכלוסייה רגישה רק לדיויפאן ומרשל
(עין יחב)

15.11.11 ✓ אוכלוסייה רגישה לספרטה (פארן)

28.12.11 ✓ אוכלוסייה עמידה לכל התכשירים חוץ
פרוקליים ורופאסט (פארן)





תריפס הפרחים המערבי (קליפורני)

חדירה מסיבית באמצע ספטמבר

הדברה ביולוגית

- 1 • טרייסר אולטרה
- 1 • ספרטה



הדברה כימית


- 2 • טרייסר אולטרה
- 2 • ספרטה
- 2 • ורטימק+נימגארד
- 2 • פרוקלים עם נימגארד
- 2 • ורטימק+טרייסר
- 1 • ורטימק+פרוקלים
- 1-2 • רופאסט
- 1 • טלסטאר
- 1-3 • דיויפאן



וירוס כתמי הנבילה של העגבנייה

Tomato spotted wilt virus (TSWV)

צופר- סילוק צמחים נגועים שאינם ארוזים בשקית לאתר האורגני
העלה את החשש להתפרצות של המחלה בשטחים הסמוכים
לאתר בחודשי החורף





אקרית אדומה מצויה

הדברה ביולוגית

- טיפול כימי בתחילת העונה
 - פלורמייט
- טיפול משולב בהמשך העונה
 - פלורמייט
 - שמן נימגארד או EOS
 - אקית הטורפת פרסימיליס
- שימוש מושכל באקרית הטורפת פרסימיליס

הדברה כימית

- טיפולים כימיים:
 - פלורמייט+אוברון/ספיידר
 - אקסמייט





נמטודות מזיקות בפלפל

- מגמת עליה במספר השטחים הנגועים במזיק
- סדרת ימי עיון להדברת נמטודות יוצרות עפצים ונמטודות חופשיות





תודות!

